

지역사회간호

문 1. 가족 사정의 기본적인 원칙으로 옳은 것은?

- ① 가족의 문제점뿐만 아니라 강점도 동시에 사정한다.
- ② 정상 가족이라는 고정적 관점으로 가족 문제를 규명한다.
- ③ 가족구성원 중 한 명으로부터 자료를 수집하여 일관성을 유지한다.
- ④ 지역사회간호사가 사정단계부터 가족의 문제점과 중재 방법을 주도적으로 제시한다.

문 2. 오타와 현장에서 제시한 건강증진의 활동 영역 중 개인의 기술 개발(develop personal skills)의 예로 적절한 것은?

- ① 다중이용시설을 금연구역으로 지정하고 지도 단속하였다.
- ② 금연 의지가 있는 사람들을 모아 동아리를 만들어 지지하였다.
- ③ 청소년을 대상으로 흡연 권유를 거절하는 방법을 교육하였다.
- ④ 청소년에 대한 담배판매금지법을 만들어 시행하였다.

문 3. 보건소에서 과체중 중년 여성을 대상으로 8주간의 운동프로그램을 실시하였다. 간호과정의 사정단계 내용으로 옳은 것은?

- ① 체중감소율을 4주, 6주, 8주 후에 각각 평가하기로 하였다.
- ② 과체중 중년 여성이 다른 지역에 비해 얼마나 많은지 비교하였다.
- ③ 지역사회간호사가 운동프로그램을 실시하였다.
- ④ ‘프로그램 참여자의 20%가 체중이 감소한다’로 목표를 설정하였다.

문 4. 다음에서 설명하는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」상 감염병은?

- 전파가능성을 고려하여 발생 또는 유행 시 24시간 이내에 신고하여야 하고, 격리가 필요한 감염병을 말한다. 다만, 갑작스러운 국내 유입 또는 유행이 예견되어 긴급한 예방·관리가 필요하여 질병관리청장이 보건복지부장관과 협의하여 지정하는 감염병을 포함한다.
- 결핵, 수두, 홍역, 콜레라, 장티푸스 등을 포함한다.

- ① 제1급감염병
- ② 제2급감염병
- ③ 제3급감염병
- ④ 제4급감염병

문 5. 다음 사례에서 가장 의심되는 식중독은?

- 지역사회 주민들이 회식 2~4시간 후 복통, 오심, 구토와 설사 등의 증상이 집단으로 발생하였으나, 38℃ 이상의 고열과 연하곤란, 시력저하 등의 신경계 증상은 보이지 않았다.
- 역학조사 결과 음식물 중 어패류 등 수산물만 없었고, 회식을 준비했던 조리사의 손가락에 화농성 상처가 있는 것으로 확인되었다.

- ① 살모넬라 식중독
- ② 보툴리누스 식중독
- ③ 장염 비브리오 식중독
- ④ (황색)포도상구균 식중독

문 6. 다음 내용은 가이거와 다비드하이저(Giger & Davidhizar)가 개발한 횡문화사정 모형(Transcultural Assessment Model)에서 어떤 문화현상을 사정한 것인가?

- 억양과 발음을 확인한다.
- 침묵을 사용하는 경향을 파악한다.
- 터치하였을 때 불편감을 느끼는 정도를 파악한다.

- ① 환경통제
- ② 사회조직
- ③ 의사소통
- ④ 생물학적 차이

문 7. 다음 설명에 해당하는 지표는?

지역 간 사망률 수준을 비교할 때 각 지역의 인구학적 특성의 차이가 사망률 수준에 영향을 미칠 수 있다. 이를 보정하기 위해 두 집단 간의 인구학적 특성의 차이를 통제하고 같은 조건으로 만들어 각 지역별로 한 개의 객관적 측정치를 산출한다.

- ① 조사사망률
- ② 연령별사망률
- ③ 비례사망지수
- ④ 표준화사망률

문 8. 진료비 지불제도의 장·단점에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 총액계약제는 보험자와 의사단체 간의 계약 체결이 용이하나 과소진료의 가능성이 있다.
- ② 포괄수가제는 양질의 의료서비스가 제공되나 진료비 청구 방법이 복잡하다.
- ③ 인두제는 예방보다 치료중심의 의료서비스가 제공되나 의사가 중증질환 환자의 등록을 기피하는 경향이 높다.
- ④ 행위별수가제는 양질의 의료서비스가 제공되나 과잉진료로 의료비 증가가 우려된다.

문 9. PATCH(Planned Approach to Community Health) 모형의 단계를 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ㄱ. 자료수집과 분석
- ㄴ. 우선순위 선정
- ㄷ. 지역사회 조직화(동원)
- ㄹ. 포괄적인 중재안 개발
- ㅁ. 평가

- ① ㄱ→ㄴ→ㄷ→ㄹ→ㅁ
- ② ㄱ→ㄷ→ㄴ→ㄹ→ㅁ
- ③ ㄷ→ㄱ→ㄴ→ㄹ→ㅁ
- ④ ㄷ→ㄱ→ㄹ→ㄴ→ㅁ

- 문 10. 건강생활지원센터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 「보건의료기본법」에 근거하여 설치한다.
 - ② 읍·면·동(보건소가 설치된 읍·면·동은 제외)마다 1개씩 설치할 수 있다.
 - ③ 센터장은 보건소장의 지휘·감독을 받아 건강생활지원센터의 업무를 관장한다.
 - ④ 지역주민의 만성질환 예방 및 건강한 생활습관 형성을 지원한다.

- 문 11. 「지역보건법」상 보건소의 기능 및 업무에 해당하는 것만을 모두 고르면?

ㄱ. 정신건강증진 및 생명존중에 관한 사항
ㄴ. 감염병의 예방 및 관리
ㄷ. 모성과 영유아의 건강 유지·증진
ㄹ. 난임의 예방 및 관리

- ① ㄱ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

- 문 12. A 산업체의 1년간 재해 관련 통계수치가 다음과 같을 때, 도수율(빈도율)은?

○ 연 근로시간 수: 100,000
○ 재해자 수: 10
○ 재해 건수: 4
○ 근로손실일수: 40

- ① 0.4
- ② 10
- ③ 40
- ④ 100

- 문 13. 보건사업 기획에서 사용되는 NIBP(Needs Impact Based Planning)의 우선순위 결정 기준은?
- ① 건강문제의 크기와 건강문제의 심각성
 - ② 건강문제의 크기와 해결방법의 효과
 - ③ 건강문제의 중요성과 자원이용 가능성
 - ④ 건강문제의 중요성과 주민의 관심도

- 문 14. B 지역의 지난 1년간 사망 관련 통계가 다음과 같을 때, α -index 값은?

구분	사망자 수(명)
생후 28일 미만	10
생후 28일부터 1년 미만	20

- ① $\frac{10}{20}$
- ② $\frac{20}{10}$
- ③ $\frac{10}{30}$
- ④ $\frac{30}{10}$

- 문 15. 지역사회간호사가 PRECEDE-PROCEED 모형을 적용하여 만성질환과 관련된 건강행위에 영향을 주는 소인요인, 가능요인, 강화요인을 사정하였다면 이에 해당하는 진단(사정)단계는?
- ① 사회적 진단
 - ② 역학적 진단
 - ③ 교육 및 생태학적 진단
 - ④ 행정적, 정책적 진단 및 중재설계

- 문 16. SWOT분석에서 강점-위협전략(ST전략)에 해당하는 것은?
- ① 불리한 환경을 극복하기 위한 신사업 개발
 - ② 위협을 회피하기 위한 사업의 축소
 - ③ 내부조직의 역량 강화를 위한 혁신 및 구조조정
 - ④ 공격적인 사업영역 확대

- 문 17. 지역사회간호의 역사적 사건들을 이른 것부터 순서대로 바르게 나열한 것은?

ㄱ. 「학교보건법」 제정
ㄴ. 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법」 제정
ㄷ. 전 국민 의료보험(현 국민건강보험) 시행
ㄹ. 노인장기요양보험제도 시행

- ① ㄱ→ㄴ→ㄷ→ㄹ
- ② ㄱ→ㄴ→ㄹ→ㄷ
- ③ ㄴ→ㄱ→ㄷ→ㄹ
- ④ ㄴ→ㄱ→ㄹ→ㄷ

- 문 18. 근로자의 업무상 재해에 대한 신속·공정한 보상과 재해근로자의 재활 및 사회복귀를 촉진하기 위한 보험시설 운영 등을 주요 목적으로 하는 기관은?
- ① 근로자건강센터
 - ② 대한산업보건협회
 - ③ 근로복지공단
 - ④ 한국산업안전보건공단

- 문 19. 지역사회간호사가 고혈압관리 프로그램의 교육목표를 ‘대상자들은 정상혈압의 범위를 말할 수 있다’로 설정한다면 이는 블룸(Bloom)이 제시한 교육을 통한 변화영역 중 어느 영역에 해당하는가?
- ① 인지적 영역(cognitive domain)
 - ② 정의적 영역(affective domain)
 - ③ 심동적 영역(psychomotor domain)
 - ④ 생리적 영역(physiological domain)

- 문 20. 고도비만인 C 씨가 가족들에게 “저 오늘부터 비만 탈출하겠습니다.” 라고 선언하는 것은 범이론 모형(Transtheoretical Model: TTM)의 어떤 변화과정에 해당하는가?
- ① 자기 해방(self liberation)
 - ② 의식 고취(consciousness raising)
 - ③ 자기 재평가(self reevaluation)
 - ④ 사회적 해방(social liberation)